

## SÍFILIS Y FACTORES DE RIESGO EN PUÉRPERAS CON CONTROL PRENATAL INADECUADO EN EL INSTITUTO DE MATERNIDAD DE TUCUMÁN

**Becaria:** Albornoz MJ, Instituto de Maternidad y Ginecología Nuestra Señora de las Mercedes de Tucumán.  
majose.albornoz@gmail.com

**Dirección:** Lazarte SS, Instituto de Maternidad y Ginecología Nuestra Señora de las Mercedes de Tucumán.

### RESUMEN

#### Introducción

La transmisión vertical de sífilis puede ocurrir durante el embarazo, parto, puerperio y lactancia. En Argentina, el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud ha observado un aumento de notificaciones de infecciones congénitas, lo que constituye en la actualidad un problema en Salud Pública.

#### Objetivos

Establecer la prevalencia de sífilis en una población de mujeres puérperas, sin serología en el último mes de gestación, que estuvieron internadas en el Instituto de Maternidad y Ginecología Nuestra Señora de las Mercedes entre octubre de 2014 y marzo de 2015. Detectar los factores que influyen sobre la prevalencia de sífilis e identificar las causas que intervienen en la falta de control prenatal (CPN) de sífilis al momento del parto.

#### Métodos

Se realizó un estudio analítico de corte transversal. Se estudió a 278 mujeres puérperas, a las que se les realizó prueba de VDRL, TP-PA y una encuesta para recolectar datos de factores socioeconómicos, conductas de riesgo y factores maternos.

#### Resultados

La prevalencia de sífilis fue de 2,9% (IC95%: 1,5-5,6%), se encontraron 3 casos de sífilis actual y 5 casos de sífilis pasada. Se revelaron los siguientes factores de riesgo para padecer sífilis en las puérperas estudiadas: ser adulta joven, no trabajar, menor número de hijos y haber tenido un mortinato. También se detectaron factores que favorecen un CPN adecuado: ser adulta, tener mayor nivel de instrucción y estar casada. Además, se demostró que no tener hábitos tóxicos actuó como factor de protección y que la causa más frecuente de falla de CPN adecuado fue la falta de solicitud por parte del médico.

#### Conclusiones

El estudio detectó una prevalencia superior a la nacional (1,321%) e identificó algunos factores de riesgo. Sería esencial fortalecer los servicios de atención prenatal existentes y la educación en salud para prevenir la transmisión de sífilis.

#### Palabras clave

*Sífilis Materna; Sífilis Congénita; Embarazo; Determinantes de Salud*