

## FACTORES ASOCIADOS EN INCIDENCIA DE CONDUCTA SUICIDA EN TUCUMÁN 2014-2015

**Becaria:** Tomás de Morán I, Dirección de Programas Integrados de Salud PRIS-SIPROSA, Tucumán.  
lic\_irmathomas@hotmail.com

**Dirección:** Alcaraz G, Dirección de Programas Integrados de Salud PRIS-SIPROSA, Tucumán.

**Colaboración:** Caram S; Vitolo D.

### RESUMEN

#### Introducción

La conducta suicida es un problema de salud pública que impacta de manera directa en el conjunto de la comunidad. Dado que no se posee una notificación al respecto, no se percibe la real magnitud. Los factores asociados a la conducta suicida son importantes en el desencadenamiento de esta problemática.

#### Objetivos

Caracterizar la conducta suicida en áreas sanitarias de Tucumán en 2014-2015.

#### Métodos

Se realizó un estudio descriptivo transversal para estimar los factores desencadenantes de la conducta suicida en áreas sanitarias seleccionadas de Tucumán durante 2014-2015. La investigación se basó en la identificación de casos de conducta suicida a través de múltiples fuentes de información y apareamiento de los datos registrados en las planillas de conducta suicida.

#### Resultados

Durante 2014-2015 se registró un total de 580 casos en las planillas de conducta suicida en el primer nivel de atención. El promedio mensual fue de 24 casos de conducta suicida. El 70% eran mujeres. El promedio de edad fue de 24 años, con un rango de 5 a 73 años. En cuanto al estado civil, hubo un 69% de pacientes solteros, un 23% de casados o en convivencia y un 7% de divorciados. Esto guarda relación directa con el grupo etario, ya que predominan los jóvenes de 10 a 19 años (49%). En lo que respecta al método empleado en el intento de suicidio, la mayoría de los casos registrados (75,5%) se reparten entre las categorías de intoxicación medicamentosa y ahorcamiento. Los casos de intoxicaciones medicamentosas registraron un 45%, con mayoría de mujeres, y el ahorcamiento representó un 31% (población masculina). En tercer lugar, aparecieron los cortes en muñecas (16%). El análisis de los factores desencadenantes mostró prevalencia de la categoría correspondiente a problemas familiares, con un 54% para esta variable.

#### Conclusiones

Es muy importante para la Salud Mental obtener datos claros y precisos sobre la provincia de Tucumán, ya que ellos permiten tener una práctica más sustentable y cercana a las características territoriales.

#### Palabras clave

*Suicidio; Factores de Riesgo; Ideación Suicida; Intento de Suicidio*