

EVOLUCIÓN A 5 AÑOS DE UNA COHORTE HISTÓRICA DE PACIENTES CON CÁNCER: TUCUMÁN 2010-2015

Becaria: Cuezco MR, Dirección de Epidemiología, Tucumán.
romicuezzo@gmail.com

Dirección: Luna MC, Dirección de Epidemiología, Tucumán.

Colaboración: Sadir ME.

RESUMEN

Introducción

Los tumores malignos son la segunda causa de muerte en Argentina y el mundo. Tucumán cuenta con un Registro de Tumores, pero en él no existen datos de evolución de la enfermedad.

Objetivos

Indagar la evolución de una cohorte histórica de pacientes con cáncer (2010-2015) a partir de múltiples fuentes de datos.

Métodos

Se trabajó con una cohorte histórica de pacientes con cáncer de mama, cérvix, pulmón, próstata y colorrectal. Se valoraron consultas, cirugías, internaciones y defunciones. Se estimaron proporciones y medidas de resumen para variables numéricas. Se estimó riesgo relativo (RR) de fallecer a 5 años del diagnóstico, con diversas variables de exposición. Se consideró $p < 0,05$.

Resultados

Un 69,3% fue de sexo femenino. En mujeres, la mayor frecuencia fue de cáncer de mama (64,7%) y en varones, de próstata (51,1%). La mediana de edad fue de 54 y 65 años para mujeres y varones, respectivamente. La mediana de edad de cáncer de cérvix fue menor en las mujeres (40 años), como lo fue de cáncer colorrectal en varones (57,5 años), comparando con otros. Un 80,5% tuvo consultas externas en hospitales públicos, un 62% tuvo al menos una internación, y un 43,7% requirió cirugías. La mediana de días de internación fue de 14 (mín.-máx.: 1-84); hubo diferencias al analizar según tipo de cáncer. Se observó mayor porcentaje de fallecidos dentro de los 5 años del diagnóstico en cáncer broncopulmonar (70,5%), seguido por cáncer colorrectal (50%). El RR de fallecer fue de 1,89 (1,45-2,47) en varones con respecto a las mujeres, y de 1,58 (1,15-2,16) en quienes tuvieron al menos una internación, respecto a quienes no la requirieron.

Conclusiones

Los diagnósticos más frecuentes fueron cáncer de mama y próstata. La mediana de edad fue inferior en mujeres. Se observó mayor mortalidad relacionada a cáncer broncopulmonar dentro de los 5 años de evolución. El riesgo de fallecer fue mayor entre los varones y quienes requirieron internación durante el período evaluado.

Palabras clave

Cáncer de Mama; Cáncer de Cuello Uterino; Cáncer Colorrectal; Cáncer Pulmonar; Cáncer de Próstata